



aardappelen

-

kartoffeln

-

potatoes

AGRIA TEELTADVIES OOGST 2016

De eigenschappen

| | Agria | Bintje |
|--------------------|---------|------------|
| Vroegrijpheid | 5 | 6,5 |
| Schilkleur | geel | geel |
| Vleeskleur | geel | lichtgeel |
| Knolvorm | lang | lang ovaal |
| Regelmaat knolvorm | 7,5 | 7 |
| Aantal knollen | 7-10 | 14-17 |
| Grootte knollen | 8,5 | 7 |
| Sortering | 7,5 | 7 |
| Opbrengst | 110 | 105 |
| Drogestof | 93 | 102 |
| Kiemrust | 7,5 | 5,5 |
| Loofontwikkeling | traag | snel |
| Loofeigenschap | robuust | normaal |
| | lang | |
| Phytophthora loof | 5,5 | 3 |
| Phytophthora knol | 7 | 4,5 |
| Aardappelmoeheid | Am A | vatbaar |
| Schurft | 4 | 5 |

Het planten

| Pootgoedssortering | plantafstand | hoeveelheid pootgoed per ha. |
|--------------------|--------------|------------------------------|
| 35/50 mm | 26 - 30 cm | 3.100 kg |
| 50/60 mm gesneden | 23 - 25 cm | 3.200 kg |

Om de exacte hoeveelheid te bepalen rekening houden met het aantal knollen per 25 kg.

Op de zwaardere gronden de kleinste plantafstand aanhouden.
Geadviseerd wordt het pootgoed altijd tegen Rhizoctonia te behandelen.

De bovenkant van de poters ca. 2 cm onder het maaiveld poten.
Vorm grote ruggen om groene knollen te voorkomen!

De bemesting

| | |
|-----------------|---|
| Stikstof | Totaal +/- 200-225 kg per ha <u>incl. bodemvoorraad</u> . Late overbemesting wordt afgeraden. Pas op voor percelen waar in het verleden veel organische mest gebruikt is, houd daar rekening met stikstofgift i.v.m. onderwatergewicht. |
| Fosfaat | Volgens bodemonderzoek. |
| Kali | Volgens bodemonderzoek, na januari chloorarme kali inzetten i.v.m. onderwatergewicht. Verse chloorarme kali is aan te bevelen i.v.m. de blauwgevoeligheid. Aan te bevelen is 300 kg zuivere kali. |
| Mangaan | Op gronden waar een gebrek verwacht wordt is het zinvol bladbemesting toe te voegen. |
| + | Dien de juiste bladbemesting toe, pas op voor bladverbranding! |

De gewasbescherming

- Agria verdraagt Sencor als onkruidbestrijdingsmiddel.
- Op tijd beginnen met de Phytophthorabestrijding en daarna een strak schema hanteren.
- Alternaria bestrijding is zeer aan te bevelen met 2 x 0.25ltr Amistar (overleg met uw adviseur)

De oogst en bewaring

- Na doodspuiten voldoende af laten harden i.v.m. grote knollen > +/- 3 weken.
 - Gebruik valbrekers in de kipper en beperk de valhoogtes tot een minimum.
 - Na inschuren de partij zo snel mogelijk droogblazen en vervolgens droog houden, partij zeer regelmatig blijven controleren op rot.
 - Condensvorming in de bovenlaag dient voorkomen te worden.
 - Ververs de box 2 x per dag een korte periode met buitenlucht.
 - Poedervormige kiemremmers kunnen gebruikt worden indien product voldoende afgehard is.
- Bewaartemperatuur:
- | | | |
|--------------------|-----|----|
| levering jan / feb | 8,0 | °C |
| levering mrt | 7,0 | °C |
| levering apr / mei | 7,0 | °C |
| levering juni | 7,0 | °C |

Teler:

Perceelsgericht advies / aandachtspunten:

Bij twijfel of vragen over de teelt kunt u altijd uw teeltadviseur raadplegen!