



RAMOS TEELTADVIES OOGST 2016

De eigenschappen

	Ramos	Bintje
Vroegrijpheid	6	6,5
Schilkleur	geel	geel
Vleeskleur	lichtgeel	lichtgeel
Knolvorm	langovaal	lang ovaal
Regelmaat knolvorm	7,5	7
Aantal knollen	10-14	14-17
Grootte knollen	8,0	7
Sortering	7,5	7
Opbrengst	110	105
Drogestof	96	102
Kiemrust	7,0	5,5
Loofontwikkeling	vrij traag	snel
Loofeigenschap	goed dekkend	normaal
Phytophthora loof	4	3
Phytophthora knol	7	4,5
Aardappelmoeheid	Am A en 50-75% D	vatbaar
Schurft	6,5	5

Het planten

Pootgoedssortering	plantafstand	hoeveelheid pootgoed per ha.
35/50 mm	32-34 cm	2.600 kg
50/60 mm gesneden	34-36 cm	2.650 kg

Om de exacte hoeveelheid te bepalen rekening houden met het aantal knollen per 25 kg.

Op de zwaardere gronden de kleinste plantafstand aanhouden.
Geadviseerd wordt het pootgoed altijd tegen Rhizoctonia te behandelen.

De bovenkant van de poters ca. 2 cm onder het maaiveld poten.
Vorm grote ruggen om groene knollen te voorkomen!

De bemesting

Stikstof	Totaal +/- 280 kg per ha incl. bodemvoorraad. Iets minder dan Bintje. N- bemesting in 2 keer geven. Grote hoeveelheden organische mest wordt afgeraden.
Fosfaat	Volgens bodemonderzoek.
Kali	Volgens bodemonderzoek, na januari chloorarme kali inzetten. Verse Kali maakt het dat de Ramos minder gevoelig is voor rooibeschatiging. Aan te bevelen is 300 kg zuivere kali.
Mangaan	Ramos is Magnesium en Mangaangevoelig. In de bladontwikkelingsfase mangaan toedienen. Hierna magnesium gebruiken.
+ Magnesium	Dien de juiste bladbemesting toe, pas op voor bladverbranding!

De gewasbescherming

<ul style="list-style-type: none">- Ramos verdraagt Sencor als onkruidbestrijdingsmiddel. Voordkeur gaat uit naar een vooropkomst toediening van Sencor.- Op tijd beginnen met de Phytophthorabestrijding en daarna een strak schema hanteren.- Alternaria bestrijding is absoluut onmisbaar bij Ramos, daar het ras <u>zeer gevoelig</u> voor Alternaria is.

De oogst en bewaring

<ul style="list-style-type: none">- Na doodspuiten is het belangrijk de aardappelen voldoende af laten harden i.v.m. grote knollen > +/- 3 weken.- Gebruik valbrekers in de kipper en beperk de valhoogtes tot een minimum.- Condensvorming in de bovenlaag dient voorkomen te worden.- Ververs de box 2 x per dag een korte periode met buitenlucht.- Poedervormige kiemremmingmiddelen kunnen gebruikt worden indien product voldoende afgehard is. <p>- Bewaartemperatuur: Geleidelijk inkoelen naar de bewaartemperatuur.</p> <table><tr><td>levering mrt</td><td>6,5</td><td>°C</td></tr><tr><td>levering apr / mei</td><td>6,5</td><td>°C</td></tr><tr><td>levering juni</td><td>6,5</td><td>°C</td></tr></table>	levering mrt	6,5	°C	levering apr / mei	6,5	°C	levering juni	6,5	°C
levering mrt	6,5	°C							
levering apr / mei	6,5	°C							
levering juni	6,5	°C							

Teler:

Perceelsgericht advies / aandachtspunten:

Bij twijfel of vragen over de teelt kunt u altijd uw teeltadviseur raadplegen!