



aardappelen

-

kartoffeln

-

potatoes

EUROSTAR TEELTADVIES OOGST 2017

De eigenschappen

	Eurostar	Bintje
Vroegrijpheid	5,5	6,5
Schilkleur	geel	geel
Vleeskleur	lichtgeel	lichtgeel
Knolvorm	ovaal/lang-ovaal	lang-ovaal
Regelmaat knolvorm	7	7
Aantal knollen	10-12	14-17
Grootte knollen	8	7
Sortering	7	7
Opbrengst	100	105
Drogestof	96	102
Kiemrust	7	5,5
Loofontwikkeling	vrij snel	snel
Loofeigenschap	hoog, stevig loof	normaal
Phytophthora loof	6,5	3
Phytophthora knol	7,5	4,5
Aardappelmoeheid	Am A,DE	vatbaar
Schurft	5,5	5

Het planten

Pootgoedssortering	plantafstand	hoeveelheid pootgoed per ha.
35/55 mm	33 - 35 cm	3.200 kg
55/60 mm gesneden	30 - 32 cm	3.400 kg

Om de exacte hoeveelheid te bepalen rekening houden met het aantal knollen per 25 kg.

Geadviseerd wordt het pootgoed altijd tegen Rhizoctonia te behandelen.

Advies om de peters ruim voor het poten af te roepen en de aardappelen te laten acclimatiseren om de diepe kiemrust te verbreken. Poten in het witte puntjes stadium geeft goede resultaten.

Poten op maaiveld diepte, vorm grote ruggen om groene knollen te voorkomen!
Zorgdragen voor een ongestoorde groei om doorwas te voorkomen.

De bemesting

Stikstof	Totaal +/- 250 kg per ha incl. bodemvoorraad. N- bemesting in 2 keer geven. 100-120 kg aan de basis, rest 130-140 kg na de knolzetting. Een lagere Stikstof gift voor de knolzetting stimuleert een hogere knolzetting per plant. Beperkte basis bemesting door middel van organische mest is mogelijk, grote hoeveelheden organische mest wordt afgeraden. Voor gronden met structureel laag OWG wees dan voorzichtig met overmaat aan Stikstof.
Fosfaat	Volgens bodemonderzoek.
Kali	Volgens bodemonderzoek, na januari chloorarme kali inzetten. Verse Kali maakt het dat Eurostar minder gevoelig is voor rooibeschatiging. Aan te bevelen is 300 kg zuivere kali.
Mangaan	Op gronden waar een gebrek verwacht wordt is het zinvol bladbemesting toe te voegen.
+ Magnesium	Dien de juiste bladbemesting toe, pas op voor bladverbranding!

De gewasbescherming

- Sencor kan **vroeg voor opkomst** worden toegepast. Na opkomst is Eurostar gevoelig voor sencor, dus niet gebruiken. Weinig gevoelig voor Basagran.
- Op tijd beginnen met de Phytophthorabestrijding en daarna een strak schema hanteren.

De oogst en bewaring

- Na doodspuiten is het belangrijk de Eurostar voldoende af te laten harden i.v.m. de huidvastheid van de knollen > +/- 3 weken.
 - Eurostar is gevoelig voor rooibeschatiging.
 - Gebruik valbrekers in de kipper en beperk de valhoogtes tot een minimum.
 - Condensvorming in de bovenlaag dient voorkomen te worden.
 - Ververs de box 2 x per dag een korte periode met buitenlucht.
 - Poedervormige kiemremmingsmiddelen kunnen gebruikt worden indien product voldoende afgehard is.
- Bewaartemperatuur: Geleidelijk inkoelen naar de bewaartemperatuur.
- | | | |
|--------------------|-----|----|
| levering jan / feb | 8,0 | °C |
| levering mrt | 7,0 | °C |
| levering apr / mei | 7,0 | °C |
| levering juni | 7,0 | °C |

Teler:

Perceelsgericht advies / aandachtspunten:

Bij twijfel of vragen over de teelt kunt u altijd uw teeltadviseur raadplegen!