



aardappelen

-

kartoffeln

-

potatoes

## FONTANE TEELTADVIES OOGST 2017

### De eigenschappen

	Fontane	Bintje
Vroegrijpheid	6	6,5
Schilkleur	geel	geel
Vleeskleur	lichtgeel	lichtgeel
Knolvorm	ovaal	lang-ovaal
Regelmaat knolvorm	7	7
Aantal knollen	10-13	14-17
Grootte knollen	6,5	7
Sortering	7	7
Opbrengst	110	100
Drogestof	105	102
Kiemrust	6	5,5
Loofontwikkeling	goed	snel
Loofeigenschap		normaal
Phytophthora loof	4,5	3
Phytophthora knol	6,5	4,5
Aardappelmoeheid	Am A	vatbaar
Schurft	5	5

### Het planten

Pootgoedsoortering	plantafstand	hoeveelheid pootgoed per ha.
35/45 mm	32 - 35 cm	1.950 kg
45/50 mm	37 - 39 cm	3.000 kg

Om de exacte hoeveelheid te bepalen rekening houden met het aantal knollen per 25 kg.

Geadviseerd wordt het pootgoed altijd tegen Rhizoctonia te behandelen.

Poten op 1 á 2 cm onder het maaiveld, vorm grote ruggen om groene knollen te voorkomen!  
Te koud en te vroeg poten kan leiden tot een onregelmatige opkomst en/of onderzeeërs.

## De bemesting

<b>Stikstof</b>	Totaal +/- 290 kg per ha incl. bodemvoorraad. Basisbemesting 200kg N voor het poten toepassen. Overbemesting 50kg N vlak na de knolzetting 2 <sup>e</sup> overbemesting 40 kg N 14-18 dagen hierna. In de praktijk zijn goede ervaringen om deze 2 <sup>e</sup> gift in de vorm van vloeibare urean of ureum toe te passen.
<b>Fosfaat</b>	Volgens bodemonderzoek.
<b>Kali</b>	Volgens bodemonderzoek, na januari chloorarme kali inzetten. <b>Verse Kali maakt het dat Fontane minder gevoelig is voor rooibeschatiging en stootblauw. Aan te bevelen is 300 kg zuivere kali.</b>
<b>Mangaan</b>	Op gronden waar een gebrek verwacht wordt is het zinvol bladbemesting toe te voegen.
<b>+ Magnesium</b>	Dien de juiste bladbemesting toe, pas op voor bladverbranding!

## De gewasbescherming

<ul style="list-style-type: none"><li>- Sencor kan vroeg voor opkomst worden toegepast, max 0,5 kg/ha. Na opkomst is Fontane gevoelig voor sencor, dus niet gebruiken.</li><li>- Op tijd beginnen met de Phytophthorabestrijding en daarna een strak schema hanteren.</li></ul>
---

## De oogst en bewaring

<ul style="list-style-type: none"><li>- Na doodspuiten is het belangrijk de aardappelen voldoende af te laten harden i.v.m. de huidvastheid van de knollen &gt; +/- 3 weken.</li><li>- Fontane is gevoelig voor rooibeschatiging.</li><li>- Gebruik valbrekers in de kipper en beperk de valhoogtes tot een minimum.</li><li>- Condensvorming in de bovenlaag dient voorkomen te worden.</li><li>- Ververs de box 2 x per dag een korte periode met buitenlucht.</li><li>- Poedervormige/vloeibare kiemremmingsmiddelen kunnen gebruikt worden indien product voldoende afgehard is.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Bewaar temperatuur: Geleidelijk inkoelen naar de bewaar temperatuur.</li></ul>	
levering jan / feb	8,0 °C
levering mrt	7,0 °C
levering apr / mei	7,0 °C
levering juni	7,0 °C

## Teler:

Perceelsgericht advies / aandachtspunten:
---

Bij twijfel of vragen over de teelt kunt u altijd uw teeltadviseur raadplegen!