



## INNOVATOR TEELTADVIES OOGST 2017

### De eigenschappen

	Innovator	Bintje
Vroegrijpheid	7	6,5
Schilkleur	geel	geel
Vleeskleur	lichtgeel	lichtgeel
Knolvorm	lang ovaal	lang ovaal
Regelmaat knolvorm	7,5	7
Aantal knollen	9	14-17
Grootte knollen	7,5	7
Sortering	7	7
Opbrengst	102	105
Drogestof	101	102
Kiemrust	5,5	5,5
Loofontwikkeling	snel	snel
Loofeigenschap	groot blad weinig stengels	normaal
Phytophthora loof	7	3
Phytophthora knol	5,5	4,5
Aardappelmoetheid	Am DE	vatbaar
Schurft	6	5

### Het planten

Pootgoedsoortering	plantafstand	hoeveelheid pootgoed per ha
28/35 mm	25 - 26,5 cm	1.500 kg
35/50 mm	32 - 33,5 cm	3.050 kg
50/60 mm gesneden	29 - 31 cm	3.150 kg
60/70 mm gesneden	35 - 37 cm	4.000 kg

Om de exacte hoeveelheid te bepalen rekening houden met het aantal knollen per 25 kg.

Geadviseerd wordt het pootgoed altijd tegen Rhizoctonia te behandelen.

De bovenkant van de poters ca. 2 cm onder het maaiveld poten.  
Vorm grote ruggen om groene knollen te voorkomen!

Innovator is een enigszins droogtegevoelig ras, dit betekend dat kunstmatige beregening tijdens het groeiseizoen snel zinvol kan zijn.

## De bemesting

<b>Stikstof</b>	Gelijk aan Bintje, totaal +/- 300 kg per ha 180 kg aan de basis, daarna 2 à 3 overbemestingen.
<b>Fosfaat</b>	Fosfaatbemesting vòòr de hoofdgrondbewerking uitvoeren. Hoeveelheid volgens bodemonderzoek.
<b>Kali</b>	Volgens bodemonderzoek, na januari chloorarme kali inzetten. <b>Verse chloorarme kali is aan te bevelen i.v.m. de blauwgevoeligheid. Aan te bevelen is 350 kg zuivere kali.</b>
<b>Mangaan</b>	Regelmatig bladbemesting toevoegen i.v.m. gevoeligheid voor magnesium- en mangaangebrek.
<b>+</b>	Dien de juiste bladbemesting toe wegens gevoeligheid voor bladverbranding! Houdt tevens rekening met de weersomstandigheden.
<b>Magnesium</b>	

## De gewasbescherming

<ul style="list-style-type: none"><li>- Innovator is gevoelig voor Sencor &gt; dus <b>niet</b> gebruiken!</li><li>- Op tijd beginnen met de Phytophthorabestrijding en daarna een strak schema hanteren.</li><li>- Alternaria bestrijding op de juiste wijze uitvoeren.</li></ul>
---

## De oogst en bewaring

<ul style="list-style-type: none"><li>- Na doodspuiten voldoende af laten harden i.v.m. grote knollen en gevoeligheid &gt; +/- 3 weken.</li><li>- Gebruik valbrekers in de kipper en beperk valhoogtes tot een minimum.</li><li>- Begin snel met gassen na de wondhelingsperiode.</li><li>- Ververs de partij 2 x per dag een korte periode met buitenlucht.</li></ul>	
-Bewaartemperatuur:	
levering jan / feb	8,5 °C
levering mrt	8,0 °C
levering apr	7,0 °C

## Teler:

Perceelsgericht advies / aandachtspunten:
---

Bij twijfel of vragen over de teelt kunt u altijd uw teeltadviseur raadplegen!