



LADY ANNA TEELTADVIES OOGST 2017

De eigenschappen

	Lady Anna	Bintje
Vroegrijpheid	6	6,5
Schilkleur	lichtgeel	geel
Vleeskleur	lichtgeel	lichtgeel
Knolvorm	lang	lang ovaal
Regelmaat knolvorm	7	7
Aantal knollen	14-17	14-17
Grootte knollen	7	7
Sortering	7,5	7
Opbrengst	102	105
Drogestof	106	102
Kiemrust	7	5,5
Loofontwikkeling	trage beginontwikkeling	snel
Loofeigenschap	normaal	normaal
Phytophthora loof	4	3
Phytophthora knol		4,5
Aardappelmoetheid	Am A, BC, D	vatbaar
Schurft	7	5
Wratziekte	resistent fysio 1	geen

Het planten

Pootgoedssortering	plantafstand	hoeveelheid pootgoed per ha.
35/45 mm	ca. 38-40 cm	2.500 kg
45/50 mm	ca. 42-44 cm	3.700 kg

Om de exacte hoeveelheid en plantafstand te bepalen houd rekening met het knolaantal per 25 kg!
Op zwaardere grond kleinste plantafstand aanhouden.

Lady Anna heeft een lange kiemrust, laat het pootgoed voor het potten acclimatiseren en goed los komen. Potten in het "witte puntjes stadium" geeft goede resultaten. Kiemen niet mechanisch of chemisch beschadigen. Geadviseerd wordt het pootgoed altijd tegen Rhizoctonia te behandelen.

Niet te vroeg potten in koude grond. Lady Anna heeft een trage beginontwikkeling, door geduld te bewaren in het voorjaar kan het gewas gemakkelijker in één keer door groeien.
Niet te diep planten, onderkant potter op het maaiveld. Lady Anna groeit diep in de rug.

De bemesting

Stikstof	Totaal +/- 275 kg per ha incl. bodemvoorraad. Lady Anna heeft een hoge stikstofbehoefte vooral tijdens beginontwikkeling. Deelgift wordt aanbevolen 200 kg voor het poten. 1 ^e overbemesting 50kg na de knolzetting, wanneer knollen een doorsnede van 10mm hebben. Laatste stikstof overbemesting 25kg om Lady Anna aan de groei te houden.
Fosfaat	volgens advies bodemonderzoek.
Kali	Volgens bodemonderzoek, na januari chloorarme kali inzetten. Verse chloorarme kali is aan te bevelen i.v.m. de blauwgevoeligheid. Aan te bevelen is 300 kg zuivere kali.
Mangaan	Mangaan en Magnesium zorgen voor een vitaal gewas en wordt geadviseerd om vroegtijdige afrijping van het gewas te voorkomen.
Magnesium	

De gewasbescherming

<ul style="list-style-type: none">- Lady Anna lijkt Sencor als onkruidbestrijdingsmiddel te verdragen. Voorkeur gaat uit naar een vooropkomst toediening van Sencor.- Op tijd beginnen met de Phytophthorabestrijding, eerste bespuiting vanaf 80% opkomst. Vanaf begin augustus bespuitingen uitvoeren met een knolbeschermend middel.- Alternaria bestrijding op juiste wijze uitvoeren.
--

De oogst en bewaring

<ul style="list-style-type: none">- Na doodspuiten is het belangrijk de aardappelen voldoende af te laten harden i.v.m. grote knollen > +/- 3 weken.- Voorzichtig rooien i.v.m. rooibeschatiging.- Gebruik valbrekers in de kipper en beperk de valhoogtes tot een minimum.- Condensvorming in de bovenlaag dient voorkomen te worden.- Ventileer kort maar regelmatig om CO²ophoping te voorkomen.- Grostop bij inschuren onder de juiste omstandigheden en indien het product voldoende is afgehard. Anders na 2 weken gassen en om de 5 weken herhalen.- Bewaartemperatuur: Geleidelijk inkoelen naar stabiele bewaartemperatuur van ca. 7°C.- Geschikt voor midden lange/ lange bewaring.
--

Teler:

Perceelsgericht advies / aandachtspunten:

Bij twijfel of vragen over de teelt kunt u altijd uw teeltadviseur raadplegen!