



aardappelen

-

kartoffeln

-

potatoes

MISS BIANKA TEELTADVIES OOGST 2017

De eigenschappen

	Miss Bianca	Bintje
Vroegrijpheid	5,5	6,5
Schilkleur	lichtgeel	geel
Vleeskleur	lichtgeel	lichtgeel
Knolvorm	lang ovaal	lang ovaal
Regelmaat knolvorm	8	7
Aantal knollen	7-10	14-17
Grootte knollen	8,5	7
Sortering	7,5	7
Opbrengst	115	105
Drogestof	96	102
Kiemrust	7,5	5,5
Loofontwikkeling	vrij traag	snel
Loofeigenschap	robuust	normaal
	lang	
Phytophthora loof	5	3
Phytophthora knol	6	4,5
Aardappelmoetheid	Am A ,BC, Partieel D	vatbaar
Schurft	5.5	5

Het planten

Pootgoedsoortering	plantafstand	hoeveelheid pootgoed per ha.
28/35 mm	19 - 22 cm	1.600 kg
35/50 mm	29 - 32 cm	3.250 kg
50/60 mm gesneden	26,5 - 28,5 cm	3.450 kg

Om de exacte hoeveelheid te bepalen rekening houden met het aantal knollen per 25 kg.

Op de zwaardere gronden de kleinste plantafstand aanhouden.
Geadviseerd wordt het pootgoed altijd tegen Rhizoctonia te behandelen.

De bovenkant van de poters ca. 2 cm onder het maaiveld poten.
Vorm grote ruggen om groene knollen te voorkomen!

De bemesting

Stikstof	Totaal +/- 140 tot 160 kg per ha <u>incl. bodemvoorraad</u> . Dit in één keer geven. Er mag <u>niet</u> gewerkt worden met organische mest!
Fosfaat	Volgens bodemonderzoek.
Kali	Volgens bodemonderzoek, na februari chloorarme kali inzetten. Verse chloorarme kali is aan te bevelen i.v.m de blauwgevoeligheid. Aan te bevelen is 350 kg zuivere kali.
Mangaan	Op gronden waar een gebrek verwacht wordt is het zinvol bladbemesting toe te voegen.
+ Magnesium	Dien de juiste bladbemesting toe, pas op voor bladverbranding!

De gewasbescherming

<ul style="list-style-type: none">- Miss Bianca is voor opkomst en na opkomst gevoelig voor Sencor. > dus geen sencor!- Op tijd beginnen met de Phytophthorabestrijding en daarna een strak schema hanteren.- Alternaria bestrijding is zeer aan te bevelen.

De oogst en bewaring

<ul style="list-style-type: none">- Na doodspuiten voldoende af laten harden i.v.m. grote knollen > +/- 3 weken.- Gebruik valbrekers in de kipper en beperk de valhoogtes tot een minimum.- Poederen op een goed afgeharde partij is mogelijk. > Dosering niet hoger dan 1 kg/ ton.- Na inschuren de partij droogblazen en vervolgens droog houden.- Condensvorming in de bovenlaag dient voorkomen te worden.- Ververs de box 2 x per dag een korte periode met buitenlucht.	
-Bewaartemperatuur:	
levering jan / feb	8,0 °C
levering mrt	7,0 °C
levering apr / mei	7,0 °C
levering juni	7,0 °C

Teler:

Perceelsgericht advies / aandachtspunten:

Bij twijfel of vragen over de teelt kunt u altijd uw teeltadviseur raadplegen!