



## MISS MALINA TEELTADVIES OOGST 2017

### De eigenschappen

	Miss Malina	Bintje
Vroegrijpheid	5,5	6,5
Schilkleur	lichtgeel	geel
Vleeskleur	geel	lichtgeel
Knolvorm	lang ovaal	lang ovaal
Regelmaat knolvorm	8	7
Aantal knollen	14-17	14-17
Grootte knollen	7	7
Sortering	7,5	7
Opbrengst	105	105
Drogestof	105	102
Kiemrust	7	5,5
Loofontwikkeling	vrij traag	snel
Loofeigenschap	goed dekkend	normaal
Phytophthora loof	6	3
Phytophthora knol	7	4,5
Aardappelmoeheid	Am A, BC	vatbaar
Schurft	6,5	5

### Het planten

Pootgoedssortering	plantafstand	hoeveelheid pootgoed per ha.
28/35 mm	25 - 27 cm	1.400 kg
35/55 mm	35 - 36,5 cm	2.850 kg

Om de exacte hoeveelheid te bepalen rekening houden met het aantal knollen per 25 kg.

Miss Malina heeft een lange kiemrust, laat het pootgoed voor het poten acclimatiseren en goed los komen. Poten in het witte puntjes stadium geeft goede resultaten. Kiemen niet mechanisch of chemisch beschadigen. Geadviseerd wordt het pootgoed altijd tegen Rhizoctonia te behandelen.

Niet te vroeg poten in koude grond. Miss Malina heeft een trage begin ontwikkeling, door geduld te bewaren in het voorjaar kan het gewas in één keer door groeien. De bovenkant van de poters circa 2 cm onder het maaiveld poten. Vorm grote ruggen om groene knollen te voorkomen!

## De bemesting

<b>Stikstof</b>	Totaal +/- 300 kg per ha incl. bodemvoorraad. Advies is 200 kg aan de basis, daarna 2 overbemestingen.
<b>Fosfaat</b>	Volgens bodemonderzoek.
<b>Kali</b>	In verband met het vrij hoge OWG en de lange knolvorm verdiend de Kali bemesting extra aandacht. Voldoende verse kali is van belang ter voorkoming van stootblauw en rooibeschatiging. <b>Aan te bevelen is circa 400 kg zuivere kali.</b> Verdeeld over 2 giften. (Bijvoorbeeld in de periode nov.-febr. en tussen poten en frezen) Op percelen met structureel hoge OWG kan een extra toepassing van chloorarme kalium zinvol zijn circa 1 week voor het sluiten van het gewas.
<b>Mangaan</b>	Op gronden waar een gebrek verwacht wordt is het zinvol bladbemesting toe te voegen.
<b>+ Magnesium</b>	Dien de juiste bladbemesting toe, pas op voor bladverbranding!

## De gewasbescherming

- Pas op met sencor! Alleen bij optimale omstandigheden en alleen voor opkomst toediening. Veiliger is het om een andere bodemherbicide te gebruiken.
- Op tijd beginnen met de Phytophthorabestrijding en daarna een strak schema hanteren.
- Alternaria bestrijding is zeer aan te bevelen.

## De oogst en bewaring

- Na doodspuiten voldoende af laten harden i.v.m. grote knollen > +/- 3 weken.
- Gebruik valbrekers in de kipper en beperk de valhoogtes tot een minimum.
- Na inschuren de partij droogblazen en vervolgens droog houden, partij zeer regelmatig blijven controleren.
- Condensvorming in de bovenlaag dient voorkomen te worden.
- Ververs de box 2 x per dag een korte periode met buitenlucht.

-Bewaartemperatuur:

levering jan / feb	9,0	°C
levering mrt	8,0	°C
levering apr / mei	8,0	°C
levering juni	8,0	°C

## Teler:

Perceelsgericht advies / aandachtspunten:

Bij twijfel of vragen over de teelt kunt u altijd uw teeltadviseur raadplegen!